



ҚўЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА
ИНГАЛИПТ - Н
INGALIPT - N

Препаратнинг савдо номи: ИНГАЛИПТ - Н

Таъсир этувчи моддалар (ХПН): эрувчан стрептоцид, норсульфазол натрий;

Дори шакли: ингаляция учун спрей.

Таркиби:

фаол моддалар: эрувчан стрептоцид, норсульфазол натрий;

1 баллон 0,75 г эрувчан стрептоцид, 0,75 г норсульфазол натрий сақлайди.

ёрдамчи моддалар: тимол, қалампир ялпиз мойи, эвкалипт мойи, глицерин, 96% этанол, полисорбат 80, сахароза, тозаланган сув.

Таърифи: оч-сарикдан тўқ-сарик ранглигача бўлган, ўзига хос хидли тиниқ суюқлик.

Фармакотерапевтик гуруҳи: ЛОР-аъзоларини даволаш учун восита

АТХ коди: R02AA20.

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

Ингалипт-Н антибактериал ва яллиғланишга қарши, шунингдек совутувчи ва чалғитувчи таъсирларни намоён қилади. Кўрсатилган фармакологик хусусиятларининг йиғ индиси юқори нафас йўллариининг ва оғиз бўшлиғининг шиллиқ қаватини яллиғланиш касалликларини мажмуавий патогенетик даволашни таъминлайди. Ингалипт-Н организмга улцероген ва умумий токсик таъсирни намоён қилмайди.

Фармакокинетикаси

Ингалипт-Н маҳаллий ингаляцион қўллаш учун мўлжалланган ва асосан яллиғланиш ўчоғида терапевтик концентрацияни ҳосил қилади. Сульфаниламидлар (эрувчан стрептоцид ва норсульфазол натрий) тизимли қон оқимида қисман сўрилади, улар қон оксиллари билан қайтувчан боғланади: эрувчан стрептоцид 12-14% га, норсульфазол натрий - 55% га. Биотрансформация жараёнида сульфаниламидларни ацетил гуруҳи шакллари ҳосил бўлади, улар шу кўринишда буйраклар орқали чиқарилади. Эрувчан стрептоциднинг ярим чиқарилиш даври 10 соатни, норсульфазол натрийники - 1,2 соатни ташкил қилади

Қўлланилиши

ЛОР-аъзолари ва оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг инфекцион-яллиғланиш касалликларини (тонзиллит, фарингит, ларингит, афтоз ва ярали стоматит) маҳаллий даволашда қўлланади.

Қўллаш усули ва дозалари.

Катталар ва 3 ёшдан ошган болаларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва бурун-ҳалқумни чайиш орқали маҳаллий қўлланади.

Катталарда суткада 3-4 марта чайиш ўтказилади.

3 ёшдан ошган болаларда агар шифокорнинг махсус кўрсатмалари бўлмаса, суткада 1-2 марта чайиш ўтказилади.

Препаратни қўллаш давомийлиги касалликнинг кечишига боғлиқ ва одатда 3-10 суткани ташкил қилади.