

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri



E. M. Ağayev

“25” *İyun* 2015-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

PANTENOL aerosol
PANTHENOL

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1q preparatın tərkibində 50 mq dekspantenol vardır (propellent nəzərə alınmadan) (100% maddəyə nəzərən).

Köməkçi maddələr: emulqasiyaedici setilstearyl spirti (A tip), makroqolqliserol kokoat, metilparahidroksibenzoat (E128), propilenqlikol, kalium-dihidrofosfat, natrium-hidrofosfat dodekahidrat, təmizlənmiş su, tetraftoretan.

Dərman forması

Ağ rəngdə, cüzi spesifik iyi olan köpük.

Farmakoterapevtik qrupu

Yara və xoraların müalicəsi üçün preparatlar.

ATC kodu: D03A X03.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Dekspantenol pantoten turşusunun spirt analoqu olub, aralıq maddələr mübadiləsinə görə pantoten turşusunda olan bioloji aktivliyi vardır. Pantoten turşusu və onun duzları suda həll olan vitaminlərdir, hansılar ki, koenzim A şəklində çoxsaylı metabolik proseslərdə iştirak edir. Dekspantenolun yerli istifadəsi zədələnmiş dəri və/və ya selikli qişaların pantoten turşusuna yüksək tələbatını kompensə edə bilər. Təsiredici substansiya dəri ilə absorbsiya olunur. Təsiredici maddənin dəri və selikli qişalarda metabolizmi üzrə ətraflı tədqiqatlar keçirilməyib.

İstifadəsinə göstərişlər

Dərinin və selikli qişaların müxtəlif zədələnmələri zamanı istifadə edilir, o cümlədən sıyrıntı və yanıqlar, aseptik cərrahi əməliyyatlardan sonrakı yaralar, dərinin transplantasiyası, bullöz və qabarlı dermatitlər.

Əks göstərişlər.

Preparatın komponentlərindən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq.

Ehtiyat tədbirləri

Konteyner təzyiqlik altındadır. Birbaşa günəş şüalarının təsirindən və 50 °C-dən yüksək temperatura qədər qızmasının qarşısını almaq lazımdır. Balon (konteyner) hətta tam istifadədən sonra açılmamalı və yandırmamalı, qazın yalnız tam buraxılmasından sonra atılmalıdır. Açıq odun və ya bərk qızdırılmış əşyaların yaxınlığında püskürtmək olmaz.

Preparatı ilk dəfə istifadə etdikdə konteyner yaxşı-yaxşı çalxalanmalı, köpük əmələ gələnə qədər birinci porsiyanı buraxmaq və yalnız sonra preparat zədələnmiş sahənin üzərinə püskürtmək lazımdır.

Köpüyün gözə düşməsindən çəkinmək lazımdır. Köpük təsadüfən gözə düşərsə, onu su ilə yumaq lazımdır.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Pantotenat plasentar baryeri aktiv nəqliyyat prosesi yolu ilə keçir və ana südü ilə sorulmasına mütənəsb olaraq xaric olur.

Nəzərə alaraq ki, deksapantenolun yerli istifadəsindən sonra mənimsənilməsi məlum deyil, Pantenol aerosolunun hamiləlik və ya laktasiya dövründə dərinin geniş sahələri üzərinə istifadəyə ehtiyac yarandıqda preparatdan istifadənin ana üçün faydasını və döl/uşaq üçün potensial riskini ciddi qiymətləndirmək lazımdır. Hamiləlik zamanı preparat göstərişlər üzrə istifadə edilə bilər. Laktasiya dövründə döş gilələri çatlarının müalicəsi üçün istifadə etdikdə preparat uşağın əmizdirilməsindən əvvəl yuyulmalıdır.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Xüsusi xəbərdarlıq yoxdur.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Pantenol aerosolun digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri məlum deyil.

Uşaqlar.

Uşaqlarda preparat həkimin göstərişi üzrə və böyüklərin nəzarəti altında istifadə olunmalıdır.

İstifadə qaydası və dozası

Pantenol aerosol zədələnmiş sahənin üzərinə gündə bir və ya bir neçə dəfə bərabər püskürdülür. Preparatı püskürdərəkən, konteyner klapanı yuxarıda olmaqla şaquli vəziyyətdə saxlanmalıdır. Keyfiyyətli köpüyü əldə etmək üçün hər istifadədən əvvəl konteyner yaxşı-yaxşı çalxalanmalıdır, xüsusilə əgər o, uzun müddət ərzində istifadə olunmamışdırsa. Əgər preparat ilk dəfə istifadə olunursa, köpük əmələ gələnədək əvvəlcə yalnız propellant püskürdülə bilər.

Taxma zədələnmiş sahəyə yaxınlaşdırılır və üzərinə yüngül basaraq preparat zədələnmiş sahənin üzərinə 1-2 saniyə ərzində 10-20 sm məsafədən püskürdülür.

Müalicənin davam etmə müddəti xəstəliyin xarakterindən və gedişindən asılı olaraq həkimin məsləhətindən sonra müəyyən edilir.

Əgər Pantenol aerosol üzərdə olan sahənin üzərinə istifadə edilərsə, onu bilavasitə üzün üzərinə püskürtmək olmaz. Belə halda preparat əlin üzərinə püskürdülür və sonra üzün müvafiq hissəsinə yaxılır. Preparatı gözə, bilavasitə ağız boşluğuna və ya buruna püskürtmək olmaz.

Doza həddinin aşılması

Pantenol aerosolu təlimata müvafiq olaraq istifadə etdikdə doza həddinin aşılması çox az ehtimal edilir.

Preparatın böyük miqdarda istifadəsi zamanı toksik effektlər gözlənilmir. Mədə-bağırsaq pozğunluqları əmələ gəldikdə simptomatik müalicə təyin edilir.

Əlavə təsirləri

Allergik reaksiyaların əmələ gəlməsi mümkündür, o cümlədən kontakt dermatit, allergik dermatit, qaşınma, ekzema, səpgilər, övrə, dəridə qıcıqlanma və suluqlar.

Buraxılış forması

58 q və ya 116 q aerosol, alüminium konteynerdə. 1 konteyner içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25° C-dən yüksək olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti.

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

İstehsalçı

MMC "Mikrofarm"

Ukrayna, 61013, Xarkov şəh., Şevçenko küç., 20.