


УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета контроля медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от « 02 » 10 2013 г



**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
ИНГАЛИПТ-Н**

Торговое название

Ингалипт – Н

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Спрей для ингаляций, 30 г

Состав

1 баллон содержит

активные вещества: стрептоцид растворимый 0,750 г,
норсульфазол натрия 0,750 г.

вспомогательные вещества: тимол, масло эвкалиптовое, масло мяты
перечной, спирт этиловый 96 % , сахар, глицерин, твин-80, вода очищенная

Описание

Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета со
специфическим запахом

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний горла. Антисептики. Прочие препараты.
Код АТХ R02AA20.

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Ингалипт-Н предназначен для местного ингаляционного применения и
образует терапевтическую концентрацию главным образом в очаге
воспаления. В системное кровообращение частично всасываются
сульфаниламиды (стрептоцид растворимый и норсульфазол натрия),
которые связываются с белками крови: стрептоцид растворимый на

12-14%, норсульфазол натрия на 55%. В процессе биотрансформации образуются ацелированные формы сульфаниламидов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида растворимого составляет 10 часов, норсульфазола натрия – 1,2 часа.

Фармакодинамика

Ингалипт – Н проявляет антибактериальное и противовоспалительное действие, а также охлаждающее и отвлекающее действие. Антибактериальное действие оказывают активные вещества сульфаниламидной группы. Их действие связано с тем, что они нарушают образование микробами необходимых для их развития ростовых факторов-фолиевой и дигидрофолиевой кислот, в молекулу которых входят пара-аминобензойная кислота. Сульфаниламиды близки по химическому составу к пара-аминобензойной кислоте, они захватываются микробной клеткой вместо пара-аминобензойной кислоты и тем самым нарушают течение в ней обменных процессов.

Антисептическое, охлаждающее и отвлекающее действие оказывают вспомогательные вещества. Комбинация указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и слизистой оболочки полости рта. Ингалипт-Н не проявляет ulcerогенного и общетоксического действия на организм.

Показания к применению

- тонзиллит
- фарингит
- ларингит
- афтозный и язвенный стоматит

Способ применения и дозы

Перед употреблением снимают с флакона предохранительный колпачок и на стержень клапана надевают приложенный распылитель. Свободный конец распылителя вводят в рот и нажимают головку на 1-2 с. Орошение производят 3-4 раза в сутки. Препарат удерживают в полости рта 5-7 мин.

Дети. Детям с 3 лет орошение производят 1-2 раза в сутки.

Курс лечения: 7-10 дней

Побочные действия

- аллергические реакции (высыпания на коже, зуд, отек в местах контакта с препаратом)
- чувство недомогания, головная боль, тошнота и рвота, диарея
- у детей возможно развитие рефлекторного бронхоспазма
- кратковременное жжение или першение

Противопоказания

- повышенная чувствительность к сульфаниламидам и эфирным маслам
- беременность и лактация
- детский возраст до 3-х лет

Лекарственные взаимодействия

При применении Ингалипта-Н с препаратами, производными пара-аминобензойной кислоты (новокаин, анестезин, дикаин), происходит инактивация антибактериальной активности сульфаниламидов.

Особые указания

Для лиц склонных к аллергии перед применением необходима консультация врача.

Не рекомендуется применять при болезнях кроветворной системы, нефрозах, нефритах, базедовой болезни, повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Перед первым применением сделать несколько нажатий на распылитель до появления дисперсной струи.

Перед применением Ингалипта-Н ротовую полость необходимо прополоскать теплой кипяченой водой; с пораженных участков полости рта рекомендуется стерильным тампоном снять некротический налет.

После использования препарата снять горловой распылитель со штока и промыть его теплой водой.

Беременность и период лактация

Нет данных

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет

Передозировка

Симптомы: аллергические реакции в виде высыпания на коже, зуда, отека в местах контакта с препаратом.

Лечение: прекратить применение препарата и обратиться к врачу, симптоматическая терапия.

Форма выпуска и упаковка

По 30 г в баллоны аэрозольные моноблочные алюминиевые с внутренним фенольно-эпоксидным защитным покрытием вместимостью 31 мл, с механическими насосами дозирующего действия, снабженные горловыми насадками и предохранительными колпачками.

На баллон методом трафаретной печати краской по ТУ 29- 02-888-79 наносят текст или наклеивают этикетку из материала для этикеток самоклеющихся.

По 1 баллону с распылителем, предохранительным колпачком и инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре от 3°С до 35°С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

2 года

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

ООО «Микрофарм». Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Микрофарм», Украина

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции

ООО «Микрофарм»

Матакова Оксана Юрьевна

тел.: 8 (057) 714-20-80

o.matakova@microfarm.com.ua