

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Лекарственное средство. Камефлю.



Лекарственная форма. Аэрозоль, по 30 г в баллонах аэрозольных с клапанами дозирующего действия.

**Краткая характеристика готовой лекарственной формы.** Камефлю представляет собой прозрачную, бесцветную жидкость, которая содержится под давлением в баллоне с клапаном дозирующего действия и при выходе из баллона образует дисперсную струю с характерным ароматным запахом.

### **Состав лекарственного средства:**

*Действующие вещества:* 1 баллон содержит хлоробутанолгидрата 0,1 г, камфоры рацемической 0,1 г, ментола 0,1 г;

*Вспомогательные вещества:* масло эвкалиптовое, изопропилмирикат, хладон 134а.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства для лечения заболеваний гортани и глотки.

Антисептические средства.

*Фармакологические свойства.*

Комбинированный препарат, оказывает местное противовоспалительное, антисептическое и умеренное «отвлекающее» действие.

**Показания для применения.** В комплексной терапии воспалительных заболеваний носа и верхних дыхательных путей.

**Информация о правильном применении.** Перед применением препарата ротовую полость необходимо прополоскать теплой кипяченой водой, снять с распылителя защитный колпачок, выходное отверстие распылителя направить в полость носа на глубину 0,5 см или на пораженный участок горла и нажать на основание распылителя сверху вниз. Во время распыления препарата следует избегать его вдыхания и попадания в глаза. Баллон держать вертикально так, чтобы распылитель находился сверху; нельзя пользоваться баллоном в перевернутом состоянии. После применения препарата на распылитель надеть защитный колпачок. Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, беречь от ударов.

### **Информация об особенностях применения.**

- Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии (высыпания на коже, зуд, отек в местах контакта с препаратом), нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
- Противопоказания к применению препарата: эпилепсия, судороги в анамнезе (в том числе фебрильные), склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш.

### **Применение у детей.**

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 18 лет не рекомендовано.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания.**

В связи с отсутствием достаточных данных применение лекарственного средства беременным и кормящим женщинам не рекомендовано.

### **Влияние на способность управлять транспортом и работать с движущимися механизмами.**

Данные о влиянии на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими механизмами отсутствуют.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Информация о случаях взаимодействия отсутствует.

Не рекомендуется применять одновременно с другими средствами для местного применения в полости носа и рта.

**Способ применения и дозы.** При заболеваниях верхних дыхательных путей аэрозоль необходимо распылять в полости носа (на глубине 0,5 см) или в полости рта путем нажатия на распылитель до упора. За одно применение у взрослых осуществляют по 2-3 распыления. Частота применения составляет 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 5-14 дней. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

**Передозировка.** Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов - активированного угля), симптоматическое лечение.

В случае передозировки при местном применении возможно усиление симптомов побочного действия.

Вдыхание больших доз ментола может привести к развитию головокружения, спутанности сознания, мышечной слабости, тошноты и двоения в глазах.

Не допускать попадания лекарственного средства в глаза.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

**Побочные эффекты.** Возможны аллергические (эритема, сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок) и бронхоспастические реакции. У пациентов с повышенной чувствительностью возможно развитие ларингоспазма, бронхоспазма и апноэ.

Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться развитием головной боли, брадикардии, мышечного тремора, атаксии, анафилактического шока и эритематозной кожной сыпи.

Иногда могут возникать реакции со стороны слизистых оболочек (ощущение жжения, сухости слизистой оболочки носоглотки, носа, появление язв в полости рта, отек в месте контакта)

При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Условия и срок хранения.** Хранить при температуре не выше + 25 °С, в недоступном для детей месте. Предохранять от падений, ударов, воздействий прямых солнечных лучей.


Срок хранения - 2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 30 г в алюминиевых баллонах с клапаном дозирующего действия, распылителем и защитным колпачком; один баллон в пачке.

**Информация о производителе.**

ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20, телефон: (057) 71-40-371.



## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства КАМЕФЛЮ

### Название лекарственного средства.

Камефлю.

### Общая характеристика.

Камефлю представляет собой прозрачную, бесцветную жидкость, которая содержится под давлением в баллоне с клапаном дозирующего действия и при выходе из баллона образует дисперсную струю с характерным ароматным запахом.

### Состав лекарственного средства.

#### *Состав на один баллон:*

*Действующие вещества:* хлоробутанолгидрат – 0,1 г, камфора – 0,1 г; ментол – 0,1 г.

*Вспомогательные вещества:* масло эвкалиптовое, изопропилмирикат, хладон 134а.

### Форма выпуска.

Аэрозоль, по 30 г в баллонах аэрозольных с клапанами дозирующего действия.

### Код классификации лекарственного средства.

Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Код АТС – R02A A20.

### Фармакологические свойства.

**Фармакодинамика.** Комбинированный препарат, оказывает местное противовоспалительное, антисептическое и умеренное «отвлекающее» действие.

**Фармакокинетика.** Камефлю предназначен для местного применения и создает терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. Медленно и в незначительном количестве в системный кровоток всасываются только хлоробутанолгидрат и камфора, которые обратимо связываются с белками крови. При биотрансформации образуются глюкурониды, в виде которых они выводятся почками.

### Показания для применения.

В комплексной терапии воспалительных заболеваний носа и верхних дыхательных путей.

### Способ применения и дозы.

При заболеваниях верхних дыхательных путей аэрозоль необходимо распылять в полости носа (на глубине 0,5 см) или в полости рта путем нажатия на распылитель до упора. За одно применение у взрослых осуществляют по 2-3 распыления. Частота применения составляет 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 5-14 дней.

Перед применением снять защитный колпачок, выходное отверстие распылителя направить в полость носа на глубину 0,5 см или на пораженный участок горла и нажать на основание распылителя сверху вниз. При применении препарата в полостях носа и рта следует задержать дыхание, а баллон держать вертикально так, чтобы распылитель находился сверху; нельзя пользо-

ваться баллоном в перевернутом состоянии. После применения препарата на распылитель надеть защитный колпачок.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

#### **Побочное действие.**

Возможны аллергические (эритема, сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок) и бронхоспастические реакции. У пациентов с повышенной чувствительностью возможно развитие ларингоспазма, бронхоспазма и апноэ.

Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться развитием головной боли, брадикардии, мышечного тремора, атаксии, анафилактического шока и эритематозной кожной сыпи.

Иногда могут возникать реакции со стороны слизистых оболочек (ощущение жжения, сухости слизистой оболочки носоглотки, носа, появление язв в полости рта, отек в месте контакта)

При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

#### **Противопоказания:**

- детский возраст до 18 лет,
- лица с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.
- эпилепсия, судороги в анамнезе (в том числе фебрильные), склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш.

#### **Передозировка.**

Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов - активированного угля), симптоматическое лечение.

В случае передозировки при местном применении возможно усиление симптомов побочного действия.

Вдыхание больших доз ментола может привести к развитию головокружения, спутанности сознания, мышечной слабости, тошноты и двоения в глазах.

#### **Меры предосторожности.**

Перед применением Камефлю ротовую полость нужно прополоскать теплой кипяченой водой. Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, предохранять от ударов.

Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Не допускать попадания лекарственного средства в глаза.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

#### **Применение у детей.**

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 18 лет не рекомендовано.

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания.**

В связи с отсутствием достаточных данных применение лекарственного средства беременным и кормящим женщинам не рекомендовано.

**Влияние на способность управлять транспортом и работать с движущимися механизмами.**

Данные о влиянии на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими механизмами отсутствуют.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Информация о случаях взаимодействия отсутствует.

Не рекомендуется применять одновременно с другими средствами для местного применения в полости носа и рта.

**Условия и срок хранения.**

Хранить при температуре не выше + 25 °С, в недоступном для детей месте. Предохранять от падений, ударов, воздействий прямых солнечных лучей.

Срок хранения - 2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска.**

Без рецепта.

**Упаковка.** По 30 г в алюминиевых баллонах с клапаном дозирующего действия, распылителем и защитным колпачком; один баллон в пачке.

**Информация о производителе.**

ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20,  
телефон: (057) 71-40-371.