

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом председателя  
Комитета контроля медицинской и  
фармацевтической деятельности  
Министерства здравоохранения СР  
Республики Казахстан  
от " 28 " 06 2017г  
№ N009117

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного препарата**

**КАМЕФЛЮ**

**Торговое название**

Камефлю

**Международное непатентованное название**

Нет

**Лекарственная форма**

Аэрозоль, 30 г

**Состав**

30 г (1 баллон) содержат

*активные вещества:* хлоробутанол гемигидрат  
(в пересчете на 100 % безводное вещество) 0,1 г  
камфора рацемическая 0,1 г  
ментол 0,1 г,

*вспомогательные вещества:* масло эвкалиптовое, изопропилмиририлат,  
хладон 134а.

**Описание**

Прозрачная бесцветная жидкость, которая находится под давлением в баллоне с клапаном дозирующего действия и при выходе из баллона образует дисперсную струю с характерным ароматным запахом

**Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для лечения заболеваний горла. Антисептики. Прочие препараты  
Код АТХ R02AA20

**Фармакологические свойства**

**Фармакокинетика**

Камефлю предназначен для местного применения и создает терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления. Медленно и в незначительном количестве в системный кровоток всасываются только хлоробутанолгидрат и камфора, которые обратимо связываются с белками плазмы крови. При биотрансформации образуются глюкурониды, в виде которых они выводятся почками.

### **Фармакодинамика**

Камефлю обладает антимикробным, противовоспалительным и легким местноанестезирующим действием, способствует нормализации дыхания больных, сужению сосудов, а также уменьшению кровенаполнения и отека пораженного участка. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Камефлю не оказывает ulcerогенного и общетоксического действия на организм.

### **Показания к применению**

Острые и хронические заболевания в стадии обострения полости носа, глотки и гортани:

- тонзиллит
- фарингит
- ларингит
- ринит
- ларинготрахеит

### **Способ применения и дозы**

При заболеваниях полости носа, глотки и гортани аэрозоль необходимо распылять в полости носа (на глубине 0,5 см) или в полости рта путем нажатия на распылитель до упора.

За одно применение у взрослых осуществляют по 2-3 распыления;

у детей в возрасте от 5 до 12 лет – по 1 распылению,

у детей от 12 до 15 лет – по 1-2 распыления.

Частота применения составляет 3-4 раза в сутки.

Курс лечения составляет 3-7 дней, не более 10 дней (до достижения терапевтического эффекта).

### **Побочные действия**

- аллергические реакции (высыпания на коже, зуд, отек в местах контакта с препаратом)

### **Противопоказания**

- детский возраст до 5 лет
- повышенная чувствительность к компонентам препарата

## **Лекарственные взаимодействия**

Неизвестны.

## **Особые указания**

Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

### *Беременность и период лактации*

Для женщин в состоянии беременности и для женщин, которые кормят грудью, способ применения и дозы не отличаются от тех, которые приведены для взрослых.

### *Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами*

Данные о влиянии на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими механизмами отсутствуют.

## **Передозировка**

*Симптомы:* аллергические реакции в виде высыпаний на коже, зуда, отека в местах контакта с препаратом.

*Лечение:* симптоматическое.

## **Форма выпуска и упаковка**

По 30 г в баллоны аэрозольные моноблочные алюминиевые с внутренним фенольно-эпоксидным защитным покрытием с клапанами дозирующего действия. Каждый баллон должен быть снабжен распылителем для носа и защитным колпачком.

Каждый баллон с распылителем, защитным колпачком и инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона для потребительской тары.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

## **Срок хранения**

2 года

Не применять по истечении срока годности.

## **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

## **Производитель**

ООО «Микрофарм», Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

## **Держатель регистрационного удостоверения**

ООО «Микрофарм», г. Харьков, Украина.

**Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)**

050014, г. Алматы, мкн. Айнабулак-1, дом 17

тел. (727) 349-44-31, 8 747 012 69 72

Е-mail: [ainur\\_2905@mail.ru](mailto:ainur_2905@mail.ru)

***Адрес организации, ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:***

050014, г. Алматы, мкн. Айнабулак-1, дом 17

тел. (727) 349-44-31, 8 747 012 69 72

Е-mail: [ainur\\_2905@mail.ru](mailto:ainur_2905@mail.ru)